

4. melléklet. A faállomány-szerkezeti típusok elterjedése a Tési-fennsík déli részén II. M 1 : 20 000

200 0 200 400 m



- A felső lombszint magassága < 8 m, a cserje- és második lombszint borítása > 33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a fa
- A felső lombszint magassága < 8 m, a cserje- és második lombszint borítása > 33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a cserje vagy a cserje és a fa
- A felső lombszint magassága < 8 m, a cserje- és második lombszint borítása 20-33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a fa
- A felső lombszint magassága < 8 m, a cserje- és második lombszint borítása 20-33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a cserje vagy a cserje és a fa
- * A felső lombszint magassága < 8 m, a cserje- és második lombszint borítása < 20%
- A felső lombszint magassága 8-15 m, a cserje- és második lombszint borítása > 33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a fa
- A felső lombszint magassága 8-15 m, a cserje- és második lombszint borítása > 33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a cserje vagy a cserje és a fa
- A felső lombszint magassága 8-15 m, a cserje- és második lombszint borítása 20-33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a fa
- A felső lombszint magassága 8-15 m, a cserje- és második lombszint borítása 20-33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a cserje vagy a cserje és a fa
- * A felső lombszint magassága 8-15 m, a cserje- és második lombszint borítása < 20%
- A felső lombszint magassága > 15 m, a cserje- és második lombszint borítása > 33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a fa
- A felső lombszint magassága > 15 m, a cserje- és második lombszint borítása > 33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a cserje vagy a cserje és a fa
- A felső lombszint magassága > 15 m, a cserje- és második lombszint borítása 20-33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a fa
- A felső lombszint magassága > 15 m, a cserje- és második lombszint borítása 20-33%, az alacsonyabb fásszárú szintek jellemző életformája a cserje vagy a cserje és a fa
- * A felső lombszint magassága > 15 m, a cserje- és második lombszint borítása < 20%

- Nyiladékok
- Fontosabb utak
- Szintvonalak
- Vágásterületek, nem záródott fiatalosok
- Szántók
- Gyepek, elszórtan facsoportokkal, cserjésekkel
- Erdők

